

Flowchart

Selvhjælpen og oppegående

Ja

Nej

Ikke yderligere tiltag MEN

Diabetes patienter
skal screenes **for trykskader**

Screening for trykskade risiko og trykskade forekomst

Foretages ved hjælp af ABV-scale og trykskade kategorisering

- Vanskelighed ved aktivitet generelt
- Vilje og evne til bevægelse
- Anvendelse af friktionsnedsættende hjælpemidler
- Eksternt tryk mere end 2 timer samme sted på kroppen
- Trykskader og grad

Verifikation af risiko for trykskade

Risikoscore 1 - 3 point = Lav risiko

Risikoscore 4 - 8 point = Middel risiko

Risikoscore 9 - 11 point = Høj risiko

Den enkelte patients risiko og evt. tilstedeværelse
af trykskade **dokumenteres**

Lav risiko

1 - 3 point

Ingen yderligere tiltag

Middel risiko

4 - 5 point

Middel risiko

**6 - 8 point eller trykskade
kategori 1 - 2**

Høj risiko

**9 - 11 point eller trykskade
kategori 3 - 4**

1. Dokumenteret trykskadeforebyggende
skummadras placeres i patientens seng

1. Dokumenteret trykskadeforebyggende
**luftbaseret madras med konstant lavt tryk
(statisk) evt. med dynamisk funktion**
placeres i patientens seng

2. Der anvendes **friktionsnedsættende hjælpemiddel** ved enhver forflytning og stillingsposition-
sændring

3. Der stillings- positionsændres således patienten maksimalt er udsat **for eksternt tryk,**
samme sted på kroppen **i 2 timer i træk**

4. I siddende stilling placeres patienten på dokumenteret trykskade forebyggende **sædepude**

5. Mentalt bevidste **patienter inddrages aktivt** i egen forebyggende indsats

6. Trykskadeforebyggende madrasser og friktionsnedsættende hjælpemidler skal tages i anvendelse, hvis patientens **mobiliseringstilstand ændres** akut eller planlagt fra fuld mobilitet til reduceret mobilitet

7. Patientens **hud observeres** for trykskader mindst én gang i hver vagt

De resterende handlinger gælder **KUN for score 6-11 point**

8. Patienten screenes for tilstedeværelse af **individuelle risikofaktorer**

Er en eller flere risikofaktorer tilstede, iværksættes forebyggende handlinger rettet specifikt mod dette område

9. **Dokumentation af anviste handlinger** tilrettet den enkelte patients risiko og eventuelle tilstedeværelse af trykskader

Fornyet screening

ved ændring i mobiliseringstilstanden

Fornyet screening hver 4. dag

eller ved ændring i mobiliseringstilstanden